

# Fluipur

# Fluipur

## Ficha Técnica Producto

### TRATAMIENTO DE PURINES

#### ETIQUETA

**Fluipur**  
TRATAMIENTO DE PURINES

**MODO DE EMPLEO**

1. Extraer el purín, costras y sedimentos (asolamientos) de la fosa a tratar. Es decir, vaciarla lo máximo posible.
2. Añadir agua a la fosa, tenga o no restos de purín o sedimentos, hasta crear una capa de agua de 3-4 cm de profundidad.
3. Mezclar FLUIPUR en tantos litros de agua como m<sup>2</sup> de rejilla se vayan a tratar.
4. Distribuir el producto una vez mezclado entre las rejillas para asegurar que cae todo dentro de la fosa.

Aplicarlo con regadera a chorro o con cañón lanza sin boquilla, siempre entre las rejillas.

**DOSIFICACIÓN**

Dosis para fosas inicialmente vacías y sin sedimentos:

<b>PORCINO</b>	1 litro de FLUIPUR para 50 m <sup>2</sup> de rejilla una vez cada mes y medio.
<b>VACUNO</b>	1 litro de FLUIPUR para 25 m <sup>2</sup> de rejilla una vez al mes.

Dosis para fosas con sedimentos o restos de purín:  
1 litro de FLUIPUR para 25 m<sup>2</sup> de rejilla una vez por semana durante tres semanas seguidas. Posteriormente continuar con la dosis recomendada para fosas vacías y sin sedimentos.

**COMPONENTES**

Complejo de esencias aromáticas, emulsionantes, tensoactivos, formaldehído estabilizado, agua y colorante.

Producto Biodegradable.  
PRODUCTO PATENTADO Nº 9.801-425.

Registro Sanitario Nº: 37101748/Z

Fecha de fabricación:  
Fecha de caducidad:  
Nº de lote:

Volumen Neto: 25 L

COMERCIALIZADO POR:

**Timac AGRO**  
Timac AGRO España, S.L.  
Polígono Arazuri-Orcoyen, Calle C, nº 32  
31160 ORCOYEN - Navarra - España  
Teléfono 948 324 520 - Fax 948 324 032  
timacagro@timacagro.es - www.timacagro.es

**ROULLIER**

**R20/21/22:** Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. **R52/53/54:** Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. **R40:** Posibles efectos cancerígenos - Pruebas insuficientes. **R43:** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. **S2:** Manténgase fuera del alcance de los niños. **S13:** Manténgase lejos de alimentos, bebidas y platos. **S36:** En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y acócese a un médico. **S36/37:** Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. **S51:** Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

DATOS TÉCNICOS	
Código producto	DCCH11G9E
Envase	Bidón 25 L
Presentación	Líquido azulado
Acondicionamiento	Palet 600 L
Dimensiones palet	1,20 X 0,80 X 1,04
Registro Sanitario	37101748/Z
Caducidad	2 años
Componentes	Complejo de esencias aromáticas, emulsionantes, tensoactivos, formaldehído estabilizado, colorantes.
Frases de riesgo	Ver etiqueta

CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS					
Objetivo	Homogenización del purín Eliminación de sedimentos Reducción de malos olores				
Modo empleo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Extraer el purín, costras y sedimentos (asolamientos) de la fosa a tratar. Es decir, vaciarla lo máximo posible.</li><li>2. Añadir agua a la fosa, tenga o no restos de purín o sedimentos, hasta crear una capa de agua de 3-4 cm de profundidad.</li><li>3. Mezclar FLUIPUR en tantos litros de agua como m<sup>2</sup> de rejilla se vayan a tratar.</li><li>4. Distribuir el producto una vez mezclado entre las rejillas para asegurar que cae todo dentro de la fosa.</li></ol> <p>Aplicarlo con regadera a chorro o con cañón lanza sin boquilla, siempre entre las rejillas.</p>				
Dosificación	Dosis para fosas inicialmente vacías y sin sedimentos:				
	<table border="1"><tr><td><b>PORCINO</b></td><td>1 litro de FLUIPUR para 50 m<sup>2</sup> de rejilla una vez cada mes y medio.</td></tr><tr><td><b>VACUNO</b></td><td>1 litro de FLUIPUR para 25 m<sup>2</sup> de rejilla una vez al mes.</td></tr></table>	<b>PORCINO</b>	1 litro de FLUIPUR para 50 m <sup>2</sup> de rejilla una vez cada mes y medio.	<b>VACUNO</b>	1 litro de FLUIPUR para 25 m <sup>2</sup> de rejilla una vez al mes.
<b>PORCINO</b>	1 litro de FLUIPUR para 50 m <sup>2</sup> de rejilla una vez cada mes y medio.				
<b>VACUNO</b>	1 litro de FLUIPUR para 25 m <sup>2</sup> de rejilla una vez al mes.				
	Dosis para fosas con sedimentos o restos de purín: 1 litro de FLUIPUR para 25 m <sup>2</sup> de rejilla una vez por semana durante tres semanas seguidas. Posteriormente continuar con la dosis recomendada para fosas vacías y sin sedimentos.				



TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.  
Pol. Orcoyen-Arazuri Calle C nº32  
31160 Orcoyen - NAVARRA  
Tel: (948) 32 45 00 - Fax: (948) 32 40 25

Versión española:  
Mayo 2012